

Protocol de recomanacions d'actuació davant el risc de COVID 19 a indústries càrnies/escorxadors

Secretaria de Salut Pública, 10 de juny 2020



Alguns drets reservats

© 2020, Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.



Els continguts d'aquesta obra estan subjectes a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0 Internacional.

La llicència es pot consultar a la **pàgina web de Creative Commons**.

Edita:

Agència Catalana de Seguretat Alimentària. Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut

Barcelona, juny de 2020

Assessorament lingüístic:

Secció de Planificació Lingüística del Departament de Salut

Disseny de plantilla accessible 1.03:

Oficina de Comunicació. Identitat Corporativa.

INTRODUCCIÓ

- Organització del treball.
- Limitació de visites externes i condicions d'actuació.
- Consideracions de caràcter d'higiene personal .
- Neteja i Desinfecció.
- Consideracions d'higiene, de caràcter general o comunitari.
- Cartells informatius.
- Trasllet dels treballadors.

POSSIBLES POSITIUS

ANNEXOS:

ANNEX 1 : SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA I SERVEIS TERRITORIALS I SERVEI D'URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC)

ANNEX 2: DOCUMENTS DE REFERÈNCIA I CONSULTA

1 INTRODUCCIÓ

Les empreses del sector càrnic inclosos els escorxadors, han estat establiments designats com a essencials per al proveïment alimentari i no han aturat les seves cadenes de producció i distribució des de l'inici de la pandèmia.

A la vegada, en un context de pandèmia i d'emergència sanitària, cal garantir la deguda protecció de la salut de totes les persones que intervenen en el sistema de producció, manipulació i transport de la matèria primera i productes elaborats .

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, la recomanació per a empreses alimentàries és seguir les normes generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció de la malaltia que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.

D'acord amb l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) actualment no hi ha evidència que els aliments siguin una font o via probable de transmissió del virus SARS-CoV-2.

Científics i autoritats de tot el món estan supervisant la propagació del virus i no hi ha hagut informes de transmissió a través d'aliments.

La transmissió del virus és per contacte directe entre persones a través de gotes respiratòries de més de 5 micres i/o per contacte amb superfícies i altres fómits contaminats amb el virus, per tant dins de l'àmbit de les indústries aquest problema cal abordar-lo des de la perspectiva dels riscos laborals.

És fonamental que tots els treballadors i responsables de la indústria alimentària estiguin informats i formats sobre les mesures d'higiene i d'autoprotecció, doncs pel contrari pot haver transmissió de COVID-19 entre persones dins de l'empresa.

La detecció precoç de les persones amb COVID-19 i la ràpida identificació i l'aïllament dels contactes estrets és fonamental per mantenir el control de la pandèmia.

És imprescindible identificar en cada etapa el risc d'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 i incorporar les mesures preventives per evitar-los i, el més important, identificar els responsables de fer-los complir. Si hi ha errors en qualsevol punt o etapa, es veurà afectada tota l'activitat i haurà un pèrdua de seguretat amb possible transmissió del virus.

És molt important respectar totes les recomanacions per evitar generar cadenes de transmissió de la malaltia entre els treballadors dins de l'establiment, per tant, aplicar al màxim les mesures de prevenció davant els risc de la COVID-19.

Mesures generals

Informació bàsica i registres de compliment

L'operador econòmic haurà d'informar i formar a tot el personal sobre la malaltia, sobre les mesures de protecció i d'higiene recomanades pels organismes oficials i sobre els protocols propis de l'empresa elaborats pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL). És aconsellable utilitzar les infografies publicades pel Departament de Salut o per altres organismes oficials.

Organització del treball

Per evitar contagis i transmissió del COVID-19, caldrà revisar els torns de treball, els processos, els espais i els circuits de tota l'empresa. Cal identificar les tasques, en què serà difícil respectar la distància de seguretat i buscar possibles solucions, com ara barreres físiques i elements de separació entre persones, modificar la forma d'executar la tasca i emprar equips de protecció individual, en funció de l'avaluació de riscos.

- Organització del treball d'oficina:
 - Si és possible potenciar el teletreball.
 - Organitzar les oficines perquè la distància entre els treballadors sigui de 2m, si no és possible caldrà instal·lar pantalles separadores.
 - Disposar de gels hidroalcohòlics a l'abast dels empleats.
 - Si no es pot garantir la distància de 1,5-2m. caldrà portar mascareta (si no es poden posar pantalles separadores). És recomanable portar-la en espais tancats si no es pot garantir una bona renovació d'aire a les oficines encara que hi hagi una distància de seguretat.
 - Intensificar la desinfecció del estris i equips de contacte directe amb les mans (teclats, sobretauls, fotocopiadora, estris de sobretaula, etc).

- Organització del treball en planta :
 - Evitar en el que sigui possible el contacte directe entre treballadors , quan més treballadors es relacionin entre ells més possibilitat de contacte i transmissió hi haurà si existís algun portador simptomàtic o asimptomàtic.
 - Mantenir al dia els treballadors de cada torn i horaris de treball per saber en cas de contagi quins han compartit espais.

- Afavorir la sectorització de zones o espais el màxim possible, perquè els estris de treball, utensilis, estris de neteja, etc. no constitueixin un focus de disseminació entre diferents zones.
 - Identificar visualment (marques, colors, sentit de pas, etc.) els circuits de pas de treballadors i mercaderies.
 - Es procurarà adaptar i flexibilitzar els torns i horaris entrades i sortides del treball i els canvis de torn per facilitar les entrades i sortides i afavorir els desplaçaments esglaonats.
 - Sectorització dels treballadors en les zones de treball: delimitar i assignar zones de treball per evitar al màxim la mobilitat de treballadors entre zones i limitar els contactes
 - Organitzar les parades de descans entremitjos de la cadena de producció o sacrifici per garantir el distanciament en les zones de descans.
 - En les zones comunes (vestidors, menjadors, zones de descans i serveis higiènics), cal assignar diferents horaris d'ús entre els diferents grups de treballadors, havent de procedir a la neteja i desinfecció d'aquestes zones després de l'ús de cada grup o torn de treball
 - Les reunions s'han de dur a terme, prioritàriament, amb sistemes telemàtics. Si són reunions d'organització del treball, han d'estar limitades a llocs en els quals es permeti assegurar la distància de seguretat entre persones o que disposin de barreres o elements físics entre els llocs de treball, després d'una reunió cal fer una neteja, desinfecció i ventilació de la sala.
- Eines de treball:
 - S'evitarà l'intercanvi d'eines de treball (ganivets, tisores, guants de malla, etc.) si no és possible, prèviament s'higienitzaran, principalment la zona per on s'agafa.
 - Tant abans com després de l'ús de cada eina i estri de treball (estri per esmolar ganivets, guants de malla, davantals de plàstic, etc.) s'han d'higienitzar, especialment per les zones on s'agafen amb les mans.

Trasllat dels treballadors

- Fomentar la mobilitat de forma individual.
- Respectar els límits d'ocupació dels vehicles i l'ús dels EPIS recomanats.

Limitació de visites externes i condicions d'actuació.

- Cal limitar al màxim les visites externes, d' empreses o particulars, reduint-les només a l'estrictament necessari per a seguir amb l'activitat productiva, com l'aprovisionament de matèries primeres i , matèries auxiliars. Es portarà un registre actualitzat de les visites externes.
- Les persones visitants aportaran una declaració responsable que no presenten símptomes compatibles amb COVID-19 i que no han estat en els darrers 14 dies en contacte amb casos d'infecció per nou coronavirus SARS-CoV-2.
- L'empresa pot fer als visitants comprovacions de temperatura si ho creu convenient abans d'entrar a les seves instal·lacions , si superen els 37,3°C no podran entrar a les instal·lacions i caldrà indicar-los que han de contactar amb els serveis d'atenció primària. Tampoc es permetrà l'entrada a persones amb simptomatologia compatible amb COVID-19, veure símptomes (pàg. 4 del Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament).
- S'establiran circuits diferenciats per a l'entrada i sortida d'aquest personal extern i s'identificarà la seva entrada i sortida.
- S'equiparà la zona d'entrada per garantir la correcta neteja i desinfecció del personal que accedeix a la instal·lació: gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de les mans, catifa amb desinfectant per al calçat, bates, mascaretes, altres equips de protecció segons la necessitats.
- Els transportistes que vagin a carregar o descarregar es quedaran a la cabina del camió el màxim temps possible, baixant-ne únicament per obrir les portes del camió, si fos necessari, o altres activitats imprescindibles.
- Tothom haurà de seguir les mesures higièniques habituals (mascareta, guants...). Abans i després de l'intercanvi de papers (albarans de recepció o expedició de mercaderies, etc.) cal rentar-se les mans (rentat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques) i mantenir la distància mínima de seguretat de 1,5-2m o disposar de barreres o elements físics de separació.

Consideracions de caràcter d'higiene personal

Totes les persones treballadores de l'empresa tan siguin fixes, eventuais, de manteniment, activitat puntual o visites caldrà que guardin una correcta higiene personal, bones pràctiques higièniques, que disposin d'equips de protecció d'acord amb la valoració del serveis de prevenció de riscos laborals.

Control de temperatura personal:

- En el cas que les empreses optin per prendre la temperatura als seus empleats o visitants a l'arribada al lloc de treball i al finalitzar la jornada o torns de treball, caldrà que es disposi d'un protocol intern que garanteixi la rigurositat d'aquesta pràctica, les condicions d'higiene, i el registre diari actualitzat.

Les persones encarregades de la presa de temperatura, aniran proveïdes d'EPIS adequats d'acord amb la valoració del servei de prevenció de riscos laborals d'acord amb l'avaluació de riscos d'aquesta activitat. Disposaran de gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans al seu lloc de treball.

Atès que en aquests moments l'evidència científica conclou que les persones infectades però asimptomàtiques poden contagiar la malaltia, el fet que no es detecti febre no garanteix totalment que les persones que accedeixin al centre de treball no puguin contagiar COVID-19.

Higiene adequada:

Els treballadors mantindran una bona higiene personal i mantindran una freqüent i adequada higiene de mans (rentat amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques, al menys durant 40 segons), especialment després del contacte directe amb persones, màquines, superfícies, eines i objectes d'ús comú i abans de posar-se guants i després de la seva retirada. S'ha d'extremar el rentat freqüentment de les mans perquè poden tenir contacte amb superfícies contaminades.

Es disposaran dispensadors de gel hidroalcohòlic en punts estratègics on l'accés a un rentamans no sigui factible.

- Material de protecció:

Cal disposar i dotar al personal dels equips de protecció d'acord amb les avaluacions de riscos efectuades pels serveis de prevenció de riscos laborals i les recomanacions de l'autoritat sanitària.

D'acord amb les tasques de cada empleat i la probabilitat de risc de contagi entre els empleats, en les diferents seccions de l'empresa (recepció, oficines, manipulació, transformació, emmagatzematge, etc.) es disposarà d'acord amb les indicacions del responsable de riscos laborals dels EPIS adequats a cada cas (bates, pantalons, granotes, gorres, burques, mascaretes, guants, pantalles protectores, ulleres, etc.). Les mascaretes hauran de cobrir la boca i nas, hauran de poder-se canviar sempre que sigui necessari i especialment quan la seva estructura estigui danyada o trencada. Caldrà recordar que l'ús de guants ha de ser una pràctica molt higiènica perquè no es creï una falsa seguretat, caldrà rentar-los cada vegada que sigui necessari d'acord amb les operacions que l'empleat realitzi d'igual manera que amb les mans.

S'adoptaran totes les mesures organitzatives per assegurar la distància de seguretat i les mesures higièniques, després si les distàncies no es poden garantir, s'aplicaran mesures col·lectives (com mampares, cortines transparents o altres) i en últim cas valorar els equips de protecció que siguin necessaris si les mesures anteriors no són suficients. Es proposaran mesures de protecció personal complementàries per reforçar les mesures anterior (ulleres/pantalles facials , etc).

Quan no es pugui garantir la distància de seguretat el material de protecció es complementarà amb ulleres/pantalles facials i etc. En alguns d'aquests casos també es podrà valorar la necessitat d'equipar la zona de treball amb mampares o altres elements que garanteixin una millor separació entre empleats per augmentar la seva protecció.

D'acord amb la valoració del serveis de prevenció riscos laborals es determinarà l'ús dels diferents tipus de mascaretes en la prevenció de l'exposició al SARS-CoV-2, mascareta quirúrgica, les mascaretes FFP2 o les FFP3.

En cas que per motius funcionals i de producció la distància de separació no pugués respectar-se, es dotarà al personal afectat de un reforç de mesures de protecció individual com poden ésser pantalles protectores, ulleres, etc. aquesta situació quedarà recollida i descrita per cada lloc de treball afectat al protocol de seguretat de la empresa, (localització del lloc, mesures extremes de protecció, etc.).

Les empreses portaran un registre actualitzat dels EPIS lliurats a cada empleat

- Hàbits d'higiene personal:

Cal reforçar els missatges de:

- No tocar-se la cara (ulls, nas i boca).
- En tossir o esternudar s'ha de cobrir la boca i el nas amb mocador d'un sol ús i tot seguit llençar-lo a la paperera amb tapa d'accionament no manual i fer rentat de mans, o bé tossir a la cara interna de colze.
- S'evitaran els hàbits socials com estrènyer la mà, abraçades, petons o qualsevol contacte físic; també s'evitaran els contactes directes o estrets.
- Dutxa diària completa.
- Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l'aigua de la cisterna.
- Neteja de mans a la sortida dels serveis higiènics.
- Desinfectar amb freqüència el telèfon mòbil, ulleres, i altres objectes personals d'ús freqüent.

Rentat de mans:

El gel hidroalcohòlic no substitueix el rentat de mans. El rentat pel manipuladors d'aliments durarà, aproximadament 40 segons i es farà, en tot cas:

- Abans de començar a manipular aliments.
- Després d'anar al WC.
- Després de tossir, esternudar o mocar-se.
- Abans de menjar.
- Després de manipular deixalles o escombraries.
- Després d'embrutar-se les mans
- El personal que porti guants haurà de rentar-se les mans abans de posar-se'ls i immediatament després de treure'ls.
- Tan important com el rentat de mans és eixugar-les. En aquest sentit, s'utilitzaran- preferentment tovalloles de paper d'un sol ús.

Neteja i Desinfecció

La supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable depenent del material de la superfície (d'entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s'intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme a les plantes de producció.

Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d'incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden implicar més contacte amb les mans. En cas de presència de persones amb sospita o malaltia per SARS-Cov-2 cal reforçar les actuacions de desinfecció en tots aquests espais i estris.

Es portarà el corresponent registre diari del compliment del Pla de Neteja i Desinfecció, fent especial esment de les actuacions de reforç pel COVID-19

Pautes generals de neteja i desinfecció:

La neteja dels espais és fonamental i sempre s'ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.

Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s'utilitzen habitualment en el local, que s'hauran d'aplicar en la concentració i condicions d'ús que indiqui l'etiqueta de cada producte. Els elements i utensilis usats per a fer aquestes actuacions (baietes, fregones) cal que es netegin i desinfectin periòdicament.

La periodicitat de la neteja i la desinfecció i el tipus d'actuacions concretes que es realitzin es determinaran en funció de les característiques i l'estat de cada establiment, zona o elements, la presència o no de casos sospitosos, probables i confirmats de COVID-19, i tenint en compte també l'activitat, ús, ocupació i instal·lacions o objectes que hi hagi en cada zona o espai.

S'intensificarà la neteja dels lavabos abans d'iniciar la jornada, després de les pauses, després de cada torn i al final de la jornada. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l'aigua de la cisterna.

A més, és important garantir la ventilació adequada de tots els espais i locals, natural quan sigui possible, abans i, especialment, després de la jornada laboral.

En el cas dels sistemes de ventilació o climatització, cal aconseguir una ventilació general forçada, que proporcioni una renovació d'aire del 100%, sense recirculació.

Consideracions d'higiene, de caràcter general o comunitari

- Els titulars, encarregats o responsables de l'empresa, seran els encarregats de supervisar els procediments de manipulació dels aliments, control de les mesures d'higiene, i el compliment de les mesures per evitar contagis entre els treballadors.
- Les diverses zones s'equiparan correctament per garantir la correcta neteja i desinfecció: a l'accés als vestidors hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic i catifes amb desinfectant per al calçat, els rentamans disposen de tot el material necessari per una correcta higiene de mans, etc.
- Es revisarà el pla de neteja i desinfecció de l'establiment i s'adaptarà a les necessitats actuals per evitar la transmissió del COVID-19. S'identificarà tant les zones com els equipaments que pel seu ús compartit necessiten una major freqüència de neteja o desinfecció (baranes de les escales, poms de portes, taquilles de treball, cortines de separació de lames, manetes obertura cambres, carros, taquilles, vestuaris, lavabos, etc).
Cal tenir especial atenció a les zones compartides com poden ser els W.C, zones on es fa el descans, etc. També són importants aquelles zones que habitualment són utilitzades per diversos treballadors i els equipaments que en aquesta s'utilitzen. Per exemple, on estan els dispositius per a la neteja i desinfecció dels ganivets que poden ser compartits per diversos treballadors, on es renten les botes, etc. Cal higienitzar permanentment els equips i eines d'ús comú (mànegues d'aigua, equips per esmolar ganivets, etc.), com també les superfícies que puguin ser susceptibles d'afavorir la transmissió.

- S'establirà un procediment sistemàtic de neteja de mans a la sortida dels vestuaris i serveis higiènics abans d'accedir a la zona de preparació, manipulació d'aliments.
- S'intensificarà la ventilació dels establiments en totes les seves zones varies vegades al dia si és possible amb ventilació natural, si això no és possible perquè hi ha ventilació mecànica, caldrà augmentar la renovació d'aire.
- Es garantirà suficient roba de treball exclusiva i/o d'un sol ús, com també la seva neteja i higienització.

Cartells informatius

Es col·locaran infografies en llocs visibles del centre de treball, especialment en els llocs d'accés, els lavabos, vestuaris, zones de descans i menjadors, en diferents idiomes per garantir la comprensió dels missatges recordant:

- La correcta higiene de mans.
- Manteniment de la distància física de seguretat (1,5- 2m)
- Utilització correcte d'EPIS (ús adequats de mascaretes i altres equipaments).
- Neteja, desinfecció i ordre dels EPIS reutilitzables (on i com guardar les mascaretes, com desinfectar les pantalles facials, etc.).
- Informació sobre la infecció, la transmissió del COVID, símptomes i prevenció

2 DETECCIÓ DE POSSIBLES POSITIUS

És molt important la detecció precoç de possibles casos i la identificació dels seus contactes estrets. Si el treballador ha estat o està en contacte amb alguna persona que ha estat declarada positiva en COVID-19 o amb alguna persona amb símptomes com tos, febre, dificultat respiratòria, o altres símptomes compatibles amb COVID19, o bé el treballador té símptomes com tos, febre, dificultat respiratòria o altres símptomes compatibles amb COVID19 ha d'avisar l'empresa i contactar amb els serveis mèdics.

Podeu consultar *Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.* https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4919/procediment_actuacio_o_enfront_casos_infeccio_nou_coronavirus_sars_cov2_fase_desconfinament_indicadors_seguiment_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y

- Si un treballador té febre o mostra simptomatologia compatible amb covid19 ha de trucar al 061 o contactar amb el Centre Atenció Primària (CAP). Si determinen que es compatible amb Covid-19 se li farà una prova PCR, segons el resultat:
 - Des del mateix moment que es sospiti que pot tenir la malaltia ha d'anar al seu domicili i fer un aïllament domiciliari. Tramitació de baixa laboral.
 - Quan disposi del resultat de la prova, si és negativa, un cop li remetin els símptomes del procés que pateix, podrà tornar a la feina, sempre que tingui l'alta mèdica.
 - En el cas de sortir positiu, haurà de fer aïllament domiciliari, d'acord amb el procediment establert pels serveis de vigilància epidemiològica i resposta a emergències de salut pública actualitzat. Si empitjora ha de trucar al 061 i contactar amb el Centre d'Atenció Primària (CAP). Un cop remetin els símptomes i passats 14 dies des de l'inici de símptomes podrà reincorporar-se a la feina un cop tingui l'alta mèdica.
 - Tots els casos confirmats són entrevistats per identificar els seus contactes estrets. Aquest contactes són entrevistats i hauran de fer una quarantena domiciliària de 14 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas. En aquests casos el SPRL identificarà els contactes estrets laborals, en col·laboració amb els Serveis de Vigilància Epidemiològica territorials, i els indicaran que han de fer quarantena domiciliària durant 14 dies.
 - Els serveis de prevenció de riscos laborals elaboraran el cens de contactes estrets de l'entorn laboral dels casos, emplenaran l'Annex 4 "Notificació de contactes del coronavirus SARS-CoV-2" que figura en el "Procediment d'actuació enfront l'infecció de casos per nou coronavirus

SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment" i l'enviaran per correu electrònic al Servei de Vigilància Epidemiològica corresponent segons territori (consultar l' Annex 1 d'aquest document)

- Totes les persones que el sistema sanitari hagi identificat com a casos o com a contactes estrets de casos han de fer un aïllament (casos) o quarantena domiciliària (contactes estrets), i disposar de la baixa laboral corresponent.
- Si les condicions dels habitatges particular no reuneixen les condicions per un aïllament correcte, ho ha de comunicar al seu Centre d'Atenció Primària .
- Cas que la prova diagnòstica sigui negativa, el professional es reincorporarà a la feina, tot complint amb les indicacions d'higiene i distància física recomanades.

Proves diagnòstiques per part de les empreses

Si l'empresa, d'acord amb el seu servei de prevenció de riscos laborals, vol realitzar o comprar proves diagnòstiques per als seus treballadors destinades a la detecció de la COVID-19 haurà de demanar aquesta una autorització a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, aquesta sol·licitud s'ajustarà als criteris i requisits establerts per la **Resolució SLT/936/2020**. <http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-sanitaria-per-a-la-realitzacio-o-la-compra-de-proves-diagnostiques-destinades-a-la-deteccio-de-la-COVID-19?category=75f95a84-a82c-11e3-a972-000c29052e2c>.

- L'empresa a partir del seu servei de prevenció de riscos laborals s'haurà de coordinar amb els serveis de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública del seu àmbit territorial (veure annex 2) per notificar els casos sospitosos i/o confirmats, per tal de dur a terme les mesures de control, la realització de la prova de PCR de confirmació, i les actuacions de detecció de contactes d'acord amb els procediments epidemiològics vigents. La notificació es realitzarà enviant degudament emplenat per correu electrònic al Servei de Vigilància Epidemiològica corresponent l'Annex 2 "Enquesta de notificació de casos de COVID19" que figura en el "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment" (consultar Annex 1 d'aquest document).
- L'empresa portarà un registre actualitzat dels resultats dels controls realitzats.
- La sol·licitud d'autorització sanitària l'ha de presentar l'entitat o empresa que hagi de dur a terme proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 als seus treballadors, tot i que la prescripció d'aquestes l'han de fer els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) que li donen servei, ja siguin propis/mancomunats o aliens amb contracte vigent, seguint els criteris i indicacions de les autoritats sanitàries.
- En el cas que les proves diagnòstiques per a la detecció de la COVID-19 es facin a través de proves serològiques i/o PCR, s'hauran d'encarregar de fer-les els laboratoris, per la qual cosa s'haurà d'adjuntar la certificació que es pot descarregar directament del formulari principal i que certifica que la realització de les proves no compromet ni afecta la realització de l'activitat per compte del sistema públic de salut de Catalunya, tant en qualitat com en termini.

- Si una empresa deriva les proves diagnòstiques de la COVID-19 (proves serològiques i/o PCR) a diferents laboratoris d'anàlisis clíniques ha de sol·licitar una autorització per a cada laboratori.
- Els laboratoris han d'estar degudament autoritzats pel Departament de Salut. En cas que no ho estiguin en el moment de la sol·licitud de l'autorització sanitària per part de l'entitat, institució, empresa o organització que hagi de realitzar proves diagnòstiques, la resolució quedarà condicionada al compliment d'aquest requisit.

ANNEX 1 : SERVEIS DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA I RESPOSTA A EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA I SERVEIS TERRITORIALS I SERVEIS D'URGÈNCIES DE VIGILÀNCIA EPIDEMIOLÒGICA DE CATALUNYA (SUVEC):

Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública
C. Roc Boronat 81-95 (edifici Salvany) 08005 Barcelona
Telèfons 935 513 693 / 935 513 674

Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC)
Telèfon: 627 480 828.
Laborables a partir de les 15 hores i les 24 hores el cap de setmana i festius.

Agència de Salut Pública Barcelona
Servei d'Epidemiologia (Barcelona ciutat) Pl. Lesseps, 1 ,
08023 Barcelona , Telèfon 932 384 545 mdo@aspb.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Barcelonès Nord i Maresme
C. Roc Boronat, 81-95 (edifici Salvany) 08005 Barcelona- Telèfon 935 513 727
uve.bnm@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Barcelona Sud
C. Feixa Llarga, s/n, 3a planta Antiga Escola d'Infermeria Hospital Universitari de Bellvitge
08907 l'Hospitalet de Llobregat Telèfon 932 607 500 ext. 2208-2558
bacelonasud@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Vallès Occidental i Vallès Oriental
Ctra. Vallvidrera, 38
08173 Sant Cugat del Vallès Telèfon 936 246 432/33 epi.valles@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central
C. Muralla del Carme, 7, 5a pl. 08241 Manresa
Telèfons 938 753 381 / 938 726 743 ; uvercc@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Girona
Plaça Pompeu Fabra, 1 (edifici de la Generalitat) 17002 Girona
Telèfon 872 975 666/ 872 975 565, epidemiologia.girona@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a Lleida i Alt Pirineu i Aran

C. Alcalde Rovira Roure, 2 25006 Lleida

Telèfon 973 701 600/634 epidemiologia.lleida@gencat.cat

Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Av. Maria Cristina, 54 43002 Tarragona

Telèfons 977 249 613 / 977 249 625 , epidemiologia.tarragona@gencat.cat

Unitat de Vigilància Epidemiològica de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre

Plaça Gerard Vergés,1 43500 Tortosa ,Telèfon 977 495 512

epidemiologia.ebre@gencat.cat .

ANNEX 2: DOCUMENTS DE REFERÈNCIA I CONSULTA

- Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment.
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4919/procediment_actuacio_enfront_casos_infeccio_nou_coronavirus_sars_cov2_fase_desconfinament_indicadors_seguiment_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- COVID-19 i seguretat alimentària: orientacions per a les empreses alimentàries (OMS)
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-covid-19/recomanacions-per-a-empreses-alimentaries/covid-19-i-seguretat-alimentaria-orientacions-per-a-les-empreses-alimentaries/
- Recomanacions d'higiene per a les empreses alimentàries
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-covid-19/recomanacions-per-a-empreses-alimentaries/recomanacions-dhigiene-per-a-empreses-alimentaries/
- Recomanacions de neteja i desinfecció d'instal·lacions en empreses alimentàries per a la prevenció de coronavirus
http://acsa.gencat.cat/ca/seguretat_alimentaria/mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-covid-19/recomanacions-per-a-empreses-alimentaries/recomanacions-de-neteja-i-desinfeccio-dinstallacions-en-empreses-alimentaries-per-a-la-prevencio-de-coronavirus/

- La d'higiene de mans amb aigua i sabó i la d'higiene de mans amb solucions hidroalcohòliques

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-sabo.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/rentat-de-mans-alcohol.pdf

- Normes per manipular aliments
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Publicacions/Consells-recomanacions/Consells_generals/4_normes/4normes_catala.pdf
- Aigua de consum humà
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/aigua-consum-huma.pdf

Consells per als treballadors:

- Consells per quant torneu de casa a la feina
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/desconfinament-tornar-casa.pdf
- Neteja i desinfecció de la llar
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-i-desinfeccio-llars.pdf
- Recomanacions per anar a fer la compra d'aliments
http://acsa.gencat.cat/web/.content/_Seguretat-alimentaria/Mesures-de-contencio-de-la-transmissio-de-COVID-19/Recomanacions-per-anar-a-la-compra_COVID-CAT.pdf
- Normes per l'aïllament domiciliari
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/consells-aillament-domiciliari.pdf
- Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari
https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4752/consells_%20persones_que_estan_a%c3%aflament_domiciliari_2020_ca.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Subdirecció general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en la fase de desconfinament. Indicadors de seguiment